

**BASF**

We create chemistry

ΟΜΑΔΑ

BM 02

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

# Serifel®

*Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI600 (Βάκιλος)  
Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Το Serifel® είναι μυκητοκτόνο που περιέχει τον βιολογικό παράγοντα *Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI600, ο οποίος παρέχει προληπτική προστασία δρώντας ανταγωνιστικά εναντίον των φυτοπαθογόνων μυκήτων, βοτρώτη, σκληρωτία και αλτερνάρια.

Κατάλληλο για χρήση σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης (ICM).

Κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 (ΕΕ L 189) και 889/2008 (ΕΕ L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Αρ. Αδείας: 60684/05-06-2018

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας  
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας  
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Περιεχόμενο:

**500** γραμμάρια

® = Σήμα κατατεθέν BASF  
811 70320 GR 2073



## **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

Φοράτε γάντια, αναπνευστική μάσκα και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

## **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Πλύνετε τα προσβεβλημένα μάτια για τουλάχιστον 15 λεπτά, με τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα και στη συνέχεια πιείτε άφθονο νερό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**

**Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες από αγροκτήματα και τους δρόμους.)**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Μυκητοκτόνο που περιέχει τον βιολογικό παράγοντα *Bacillus amyloliquifaciens* στέλεχος MBI600, ο οποίος παρέχει προληπτική προστασία δρώντας ανταγωνιστικά εναντίον των φυτοπαθογόνων μυκήτων, βοτρυτή, σκληρωτίνια και αλτερνάρια. Παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων και την μυκηλιακή ανάπτυξη τροποποιώντας την μεμβρανική δομή. Σχηματίζει ένα φυσικό φράγμα εμποδίζοντας την προσκόλληση του παθογόνου στο φυτό. Προάγει την έκκριση λιποπεπτιδίων κατά την ανάπτυξη του φυτού, δημιουργώντας μια ζώνη αναστολής της δημιουργίας αποικίας του παθογόνου. Προκαλεί το μηχανισμό φυσιολογικής αντίστασης του φυτού στο παθογόνο.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (δόση σκευάσματος):**

**ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο):** Για Βοτρυτή (*Botrytis cinerea*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από το τέλος της άνθησης μέχρι τη συγκομιδή (BBCH 67-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 10 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

**ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):** Για Βοτρυτή (*Botrytis cinerea*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση έως και την ωρίμανση των καρπών (BBCH 55-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

**ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):** Φραγκοστάφυλο μαύρο, Φραγκοστάφυλο κόκκινο, Φραγκοστάφυλο κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, Μούρο-σμέουρο/*Rubus x loganobaccus*, Σμέουρο κόκκινο, κίτρινο, Μύρτιλλο: Για Βοτρύτη (*Botrytis cinerea*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση έως και την ωρίμανση των καρπών (BBCH 55-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

**ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):** Για Βοτρύτη (*Botrytis cinerea*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση έως και την ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

**ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου):** Για Αλτερναρίωση (*Alternaria solani*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση έως και την ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89). Δόση: 25 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 15-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

**ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΙΚΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):** Ρόκα, Λυκοτρίβολο, Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα Αντίδια, Κιχώριο, κοκκινόχρωμο Κιχώριο, Γαιοκάρδαμο, Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες, Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβ. ειδών κράμβης): Για Βοτρύτη (*Botrytis cinerea*) και Σκληρωτία (*Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotinia minor*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας κατά την ανάπτυξη του φυλλώματος ως και τη συγκομιδή (BBCH 10-49). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

**ΣΠΑΝΑΚΙ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):** Για Βοτρύτη (*Botrytis cinerea*) και Σκληρωτία (*Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotinia minor*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας κατά την ανάπτυξη του φυλλώματος ως και τη συγκομιδή (BBCH 10-49). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

**ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΑ ΑΝΘΗ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):** Μαϊντανός\*, Φραγκομαϊντανός\*, Σχοινόπρασο\*, Φύλλα σέλινου\*, Φύλλα άνηθου\*, Φασκόμηλο\*, Δενδρολίβανο\*, Θυμαρί\*, Βασιλικός\*, Δάφνη\*/ Δαφνόφυλλα\*, Δρακόντιο\*/ Εστραγκόν\* (χρήσεις ήσσονος σημασίας): Για Βοτρύτη (*Botrytis cinerea*) εφαρμόστε προληπτικά από την εμφάνιση του 1<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου μέχρι το φυτό να αποκτήσει το τυπικό για την καλλιέργεια

μέγεθος (BBCH 10-49). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

**ΛΑΧΑΝΑΚΙ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ\*** (Υπαίθρου) (χρήση ήσσονος σημασίας): Για **Βοτρύτη (*Botrytis sp.*)** εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την εμφάνιση του 1<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως και την πλήρη ανάπτυξη των καρπών (BBCH 10-49). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

**ΜΠΑΜΙΑ\*** (Υπαίθρου) (χρήση ήσσονος σημασίας): Για **Βοτρύτη (*Botrytis sp.*)** εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την εμφάνιση του 5<sup>ου</sup> άνθους έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 55-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

**ΠΑΤΑΤΑ**: Για **Φουζαρίωση\* (*Fusarium oxysporum*)** (χρήση ήσσονος σημασίας\*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την εμφάνιση του 1<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως και τη συγκομιδή (BBCH 11-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

**ΜΠΡΟΚΟΛΟ\*** (χρήση ήσσονος σημασίας): Για **Βακτηριώσεις (*Bacteria*)** εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την εμφάνιση του 1<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου και μέχρι η κεφαλή να αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα (BBCH 10-49). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

**ΦΑΣΟΛΙ ΝΩΠΟ, με και χωρίς λοβό (Υπαίθρου) ΚΑΙ ΦΑΣΟΛΙ ΞΕΡΟ (όσπριο) (Υπαίθρου)**: Για **Βοτρύτη (*Botrytis sp.*)** (χρήση ήσσονος σημασίας\*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των λοβών (BBCH 61-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

**ΑΡΑΚΑΣ\*** (Υπαίθρου) (χρήση ήσσονος σημασίας): Για **Ασκοχύτωση (*Ascochyta pinodes, Ascochyta pisi*)** εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των λοβών (BBCH 61-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

**ΦΑΚΗ\*** (Υπαίθρου) (όσπριο) (χρήση ήσσονος σημασίας): Για **Αλτερνάρια (*Alternaria sp.*)** εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των λοβών (BBCH 61-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

**ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ:** Για **Αλτερνάρια\*** (*Alternaria alternata*) (χρήση ήσσονος σημασίας\*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση ως και την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

**ΚΥΔΩΝΙΑ\*, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ\*** (χρήσεις ήσσονος σημασίας): Για **Αλτερνάρια** (*Alternaria alternata*) και **Βακτηριακό κάψιμο** (*Erwinia amylovora*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση ως και την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

**ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ:** Για **Κλαδοσπόριο\*** (*Venturia carpophila*), **Σκωρίαση\*** (*Tranzschelia pruni-spinosae var. pruni-spinosae*) και **Βακτηριώσεις\*** (*Xanthomonas sp.*) (χρήσεις ήσσονος σημασίας\*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση ως και την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

**ΚΕΡΑΣΙΑ\*, ΒΥΣΣΙΝΙΑ\*** (χρήσεις ήσσονος σημασίας): Για **Κλαδοσπόριο** (*Venturia carpophila*), **Σκωρίαση** (*Tranzschelia pruni-spinosae var. pruni-spinosae*), **Βακτηριώσεις** (*Xanthomonas sp.*) και **Φαιά σήψη** (*Monilia sp.*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση ως και την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ:** Για **Βακτηριώσεις\*** (*Xanthomonas sp.*) (χρήση ήσσονος σημασίας\*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση ως και την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

**ΕΛΙΑ (Επιτραπέζια & Ελαιοποιήσιμη):** Για **Γλοιοσπόριο\*** (*Colletotrichum gloeosporioides*, *Colletotrichum acutatum*, *Colletotrichum clavatum*) (χρήσεις ήσσονος σημασίας\*) εφαρμόστε προληπτικά μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 15-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

**ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ\*** (χρήση ήσσονος σημασίας): Για **Τεφρά σήψη** (*Botrytis cinerea*) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση ως και την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό ή σε εναλλαγή με άλλα εγκεκριμένα προϊόντα εναντίον του βοτρώτη.
2. Συστήνεται η εφαρμογή του ψεκαστικού διαλύματος μέχρι απορροής, αποφεύγοντας τις ώρες με υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή σχετική υγρασία.
3. Να μην χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια ή εάν αναμένεται βροχόπτωση.
4. Χρησιμοποιήστε τον μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού για μεγαλύτερα ή πυκνότερα πρέμνα.
5. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε πριν την προσβολή. Το Serifel® παρέχει προληπτική προστασία. Επαναλάβετε συχνά την εφαρμογή.
6. Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά.

### **\* Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας:**

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Όλες οι αναφερόμενες καλλιέργειες στο φάσμα δράσης: 0 ημέρες.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει *Bacillus amyloliquefaciens* strain MBI600 που ανήκει στην ομάδα F6 κατά FRAC.

Κατάλληλο για χρήση σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης (ICM).

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** –

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το βυτίο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε τη μισή ποσότητα του σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με το υπόλοιπο νερό και τέλος προσθέτουμε την υπόλοιπη ποσότητα του σκευάσματος υπό ανάδευση. Συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις φορές το βυτίο (3 φορές το

10% του όγκου του βυτίου) και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό (3) ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ**

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε χώρο καλά αεριζόμενο και θερμοκρασίες από 4°C έως 20°C.

 **BASF**

We create chemistry

ΟΜΑΔΑ

BM 02

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

# Serifel®

*Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI600 (Βάκιλος)  
Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Το Serifel® είναι μυκητοκτόνο που περιέχει τον βιολογικό παράγοντα *Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI600, ο οποίος παρέχει προληπτική προστασία δρώντας ανταγωνιστικά εναντίον των φυτοπαθογόνων μυκήτων, βοτρώτη, σκληρωτία και αλτερνάρια.

Κατάλληλο για χρήση σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης (ICM).

Κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 (ΕΕ L 189) και 889/2008 (ΕΕ L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Αρ. Αδείας: 60684/05-06-2018

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας  
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας  
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Περιεχόμενο:

**500** γραμμάρια

® = Σήμα κατατεθέν BASF  
811 70320 GR 2073

