

Cantus® 50 WG

boscalid (μπόσκαλιντ)

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: boscalid 50% β/β (ομάδα: καρβοξαμιδικά)
Βοηθητικές ουσίες 47,9% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του βοτρώτη στο αμπέλι με προληπτική και θεραπευτική δράση και της αλτερναρίωσης στη μηλιά και την αχλαδιά. Καταπολεμά επίσης τον βοτρώτη και την αλτερναρίωση στην ακτινιδιά σε μετασυσλλεκτικές εφαρμογές.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60252/13-4-2009

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 2106860130, www.basf-agro.gr

Περιεχόμενο: **240** γραμ.

© Σήμα κατατεθέν BASF

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Οι χειριστές θα πρέπει να φορούν κατάλληλη φόρμα εργασίας και σταθερά παπούτσια. Επιπλέον οι χειριστές/εργάτες που σχετίζονται με την διαδικασία εμβάπτισης των καρπών θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια. Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία (μακρύ παντελόνι, μπλούζα με μακριά μανίκια) και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε τα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα μάτια που έχουν επηρεαστεί κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και ζητήστε συμβουλή ειδικού οφθαλμιάτρου.

Σε περίπτωση κατάποσης: Να ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά να πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική φροντίδα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 210-7793777.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε **μία αψεκαστή ζώνη προστασίας 5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Κάυση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε εξουσιοδοτημένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλιβάνο αποτέφρωσης (>1100°C, 2sec). Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται πριπλό ζέλιγμα (να νερό του ζετλίματος τα ριχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Οι άδειες συσκευασίες να μην χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ:

ΗΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

- Τα υγρά απόβλητα από την εφαρμογή με Εμβάπτιση, υποβάλλονται σε επεξεργασία με μία από τις εγκεκριμένες διαδικασίες απορύπανσης και έπειτα διοχετεύονται στο σύστημα αποχέτευσης, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι συνδεδεμένο με εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων.

- Αν κάποιο από αυτές τις προϋποθέσεις δεν ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η εργασία αυτή σε ειδικό/εξουσιοδοτημένο συνεργείο που ανήκει σε εγκεκριμένη επιχείρηση για την ασφαλή διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων.

Σε περίπτωση χρήσης από συσκευαστήρια που δεν πληρούν τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9, παράγραφο 12 και το άρθρο 10, παράγραφο 7 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α' 8).

Αρ. παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερ. παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερ. λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



Cantus® 50 WG

boscalid (μπόσκαλιντ)

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του βοτρώτη στο αμπέλι με προληπτική και θεραπευτική δράση και της αλτερναρίωσης στη μηλιά και την αχλαδιά. Καταπολεμά επίσης τον βοτρώτη και την αλτερναρίωση στην ακτινιδιά σε μετασυσλλεκτικές εφαρμογές.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60252/13-4-2009

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: **240** γραμ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 2106860130, www.basf-agro.gr

BASF
We create chemistry

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Η δραστική ουσία boscalid ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών και δρα εμποδίζοντας την κυτταρική αναπνοή στο σύμπλοκο II της αναπνευστικής αλυσίδας.

Το Cantus® 50 WG σταματά την βλάστηση των σποριών, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τον σχηματισμό των spores, με τα οποία ο μύκητας διασπείρει στους φυτικούς ιστούς, εμφανίζοντας προληπτική κυρίως αλλά και θεραπευτική δράση στην έναρξη της μόλυνσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Αμπέλι, Μηλοετή: ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας Ακτινιδιά: εμβάπτιση καρπών (μετασυσλλεκτικές εφαρμογές)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ:

Η απαιτούμενη δόση του σκευάσματος προστίθεται στη μισή ποσότητα νερού, αναδεύεται καλά και συμπληρώνεται με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ: Πραγματοποιήστε ψεκασμούς καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας για την καταπολέμηση του **Βοτρώτη (Botrytis cinerea)** στο τέλος της άνθησης ή πριν το κλείσιμο του σταφυλιού ή πριν τη συγκομιδή με δόση 120 γραμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Ουκως ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ* (μικρής σημασίας χρήση): Πραγματοποιήστε ψεκασμούς καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας για την καταπολέμηση της **Αλτερναρίας (Alternaria alternata)** που ξεκινούν κατά την έναρξη της άνθησης, μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το μισό του τελικού τους μεγέθους με δόση 40 γραμ./στρέμμα. **Ουκως ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ, μια μετασυσλλεκτική χρήση* (μικρής σημασίας χρήση): Κάνετε 1 μετασυσλλεκτική εφαρμογή (εμβάπτιση καρπών) για την καταπολέμηση του **Βοτρώτη (Botrytis cinerea)** και της **Αλτερναρίας (Alternaria sp.)**, 60 ημέρες πριν τη διάθεση των καρπών στην αγορά με δόση 75 γραμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια τα οποία έχει γίνει εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
2. Εφαρμόστε το Cantus® 50 WG σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με βοτρωδικτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης, με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
3. Αυστηρή εφαρμογή της μιας μόνο επέμβασης ανά καλλιεργητική περίοδο, για το αμπέλι.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και των ακτινιδιών (μετασυσλλεκτική χρήση) από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του, επομένως, η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

- Σταφύλια: 28 ημέρες.
 - Αχλαδία, Μηλα: 7 ημέρες
 - Ακτινιδία: Τηρήστε ένα χρονικό διάστημα ασφαλείας 60 ημερών μεταξύ της μετασυσλλεκτικής εφαρμογής και διάθεσης των καρπών προς κατανάλωση.
- ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίκετας.
- ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΧΕΤΗΣΗΣ:** Αποθηκευμένο στην αρχική του συσκευασία, κλειστή σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.