

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
«Απαγορεύεται η εφαρμογή του σκευάσματος με ψεκαστίρες πλάτης»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.


ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
- ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσεως της ετικέτας ως προς τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος σε κάθε προτεινόμενη καλλιέργεια.
- ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Α) Αγκινάρες, ραβδί, μαρούλι, σκαρόλα: κανένα. Β) Ψυχανθή, καλαμίνι, σόργο, κάρτο, πατάτα, σέλινο, φράουλα, βεμβάκα: 5 μήνες. Γ) Ζαχαρότευλα, σπανάκι, κολοκυνθοειδή, λάχανο, ελαοκρόμβη, κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριά, τομάτα, μελιτζάνα: 8 μήνες. Δ) Σιτηρά, αρνισακίδα για βοσκή, γρασίδι: 12 μήνες.
Το εδάφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί KERB FLO 400 SC πρέπει να οργωθεί σε βάθος 15 εκ. πριν να σπαρθεί με σιτηρά, αρνισακίδα ή οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια που δεν αναφέρεται παραπάνω. Οι παραπάνω χρόνοι είναι οι μείνιστοι που απαιτούνται. Ο χρόνος αναμώσης μπορεί να μειωθεί σε θερμά κλίματα καθώς και όταν χρησιμοποιούνται οι χαμηλές δόσεις εφαρμογής.
- ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να αποφεύγεται η επανεισόδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
1) Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά, Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κουδωνιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερσιά), Αμπέλι, Ραβδί, Ηλιάνθος, Ελαοκρόμβη, Καλλυσιπτικά δέντρα και θάμνοι: Μην εφαρμόζονται. 2) Μπρόκολο, Λάχανο Κουνουπίδι, Αγκινάρα: 60 ημέρες. 3) Φασολάκια ωπιά, Φακή: 90 ημέρες. 4) Μαρούλι, Αντίδι: 28 ημέρες. 5) Άγρια αγκινάρα: 120 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Επιμίξτε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώσουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.
ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: ---

Δεν είναι φυτοτοξικός στην συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρίψιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποθιζάνεται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΕΚΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Dow Dow AgroSciences



Propryzamide (προπιζαμίτι) Πυκνό εναιώρημα (SC)
Εγγυημένη σύνθεση: propryzamide 40% β/ο (ομόδα βενζαμίδια)
Βοηθητικές ουσίες 61,85% β/β

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από τις ρίζες και μετακινείται αποπλάστικα. Η ζιζανιοκτονό δράση του οφείλεται στην παρεμπόδιση του πολυμερισμού της τουμπουλίνης με αποτέλεσμα την αναστολή της αύξησης του ριζικού συστήματος.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Υπόπιο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προεπιλογής. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 7956/ 13-4-2011
Περιεχόμενο: 600 κ. εκ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Dow AgroSciences B.V., Ιταλία.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: Dow AgroSciences Export S.A.S., Γαλλία.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr
™ Trademark of the Dow Chemical Company (Dow) or any affiliated company of Dow.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά ή αμέσως μετά τη μεταφύτευση.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ
Εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της Κουσκοούτας, καθώς και ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων*.

- 1. ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά), ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κουδωνιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερσιά), ΑΜΠΕΛΙ:** Εφαρμόζεται ανάμεσα στις γραμμές προφυτρωτικά επιφανειακά. Δόση: 187,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.
- 2. ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ:** Εφαρμόζεται α) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά, β) αμέσως μετά τη μεταφύτευση. Δόση: 250 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.
- 3. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΑΡΟΥΛΙ:** Εφαρμόζεται α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά, γ) αμέσως μετά τη μεταφύτευση. Δόση: 375 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.
- 4. ΡΑΔΙΚΙ:** Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά έως το 4^ο φύλλο. Δόση: 375 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.
- 5. ΑΝΤΙΔΙ:** Εφαρμόζεται α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά. Δόση: 375 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.
- 6. ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΝΩΠΑ, ΦΑΚΗ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ:** Εφαρμόζεται α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά. Δόση: 187,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.
- 7. ΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΑΓΡΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά στην έναρξη ανάπτυξης του βλαστού. Δόση: 375 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.
- 8. ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ:** Εφαρμόζεται μετά το στάδιο των 2-4 φύλλων. Δόση: 187,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.
- 9. ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ:** Εφαρμόζεται στις γραμμές φύτευσης ή στο 50% της επιφάνειας του εδάφους. Δόση: 375 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 για όλες τις καλλιέργειες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
*** ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ**
Πλατύφυλλα: Κουσκοούτα (*Cuscuta spp.*), Πολυκόμμι (*Polygonum aviculare*), Αγριοπιπεριά (*P. Persicaria*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Βερόνικα (*Veronica spp.*), Αντράκια (*Portulaca oleracea*).
Αγρωστώδη: Αλενονούρα (*Alopecurus myosuroides*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Κοινή πόα (*Poa annua*).
1. Στα φυλλώδη λαχανικά για την καταπολέμηση της κουσκοούτας, η δόση μπορεί να αυξηθεί έως τα 500 κ.εκ./στρέμμα.
2. Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνας στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος KERB FLO 400 SC.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

