

0619070

Spotlight® C 24 EC

Carfentrazone-ethyl (Καρφεντραζόν εθύλ)

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Περιεχόμενο: 125 κ.εκ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: FMC Chemical sprl,
Rue Royale 97, 4 Floor, 1000 Brussels, Βέλγιο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ,

Λ. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα. ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
15125 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.bASF-agro.gr

 • BASF
We create chemistry

Εγγ. σύνθεση: Carfentrazone ethyl 24% β/ο (ομάδα τριαζολινονών)
Βοηθητικές ουσίες 72,4% β/β

Αποφυλλωτικό βάμβακος

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 8139/10-9-2007

ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ



®Σήμα κατατεθέν FMC



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διατηρήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

Το SPOTLIGHT® C 24 EC είναι φυτορρυθμιστικό σκεύασμα που προορίζεται για την αποφύλλωση του βάμβακος, με σόχο τη διευκόλυνση της συγκομιδής του προϊόντος. Το δρων συστατικό του σκευάσματος (carfentrazone-ethyl) έχει ζιζανιοκτόνο δράση που οφείλεται στην παρεμπόδιση του ενζύμου οξειδάση του πρωτοπορφυρογόνου (protoporphyrinogen oxidase, PPG-O ή PP-O), ενός βασικού ενζύμου για τη βιοσύνθεση της πρωτοπορφυρίνης (protoporphyrin).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Βαμβάκι: Ψεκασμός φυλλώματος πριν τη συγκομιδή, όταν τουλάχιστον το 40-50% των καρυδιών έχει ανοίξει και το 70% είναι φυσιολογικά ώριμα. Δόση: 21 κ.εκ. ανά στρέμμα, όταν χρησιμοποιείται μόνο του, ή 12.5 κ.εκ ανά στρέμμα + 208 κ.εκ. ανά στρέμμα Ethepron 48% SL. Όγκος ψεκαστικού διαλύματος: 50-60 λίτρα νερού ανά στρέμμα. Η πίεση του ψεκασμού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3Atm. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα. Απαγορεύεται η βόσκηση των ζώων μετά τη συγκομιδή του βάμβακος.

ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Οι καλλιέργειες Σιτηρά, Μπιζέλι και Τεύτλα μπορούν να σπαρούν ένα μήνα μετά την εφαρμογή του SPOTLIGHT® C. Όλες οι υπόλοιπες καλλιέργειες μπορούν να σπαρούν τρεις μήνες μετά την εφαρμογή του.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας. Συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν το δραστικό συστατικό ethepron 480 g/l στην εφαρμογή του μίγματος βυτίου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Βαμβάκι – 7 ημέρες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι φιάλες ξεπλένονται τρεις φορές (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Spotlight® C 24 EC

Carfentrazone-ethyl (Καρφεντραζόν εθύλ)

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Περιεχόμενο: 125 κ.εκ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: FMC Chemical sprl,
Rue Royale 97, 4 Floor, 1000 Brussels, Βέλγιο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: FMC Χημικά Εμπόριο ΜΕΠΕ,
Λ. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα. ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
15125 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

 • BASF
We create chemistry

Εγγ. σύνθεση: Carfentrazone ethyl 24% β/ο (ομάδα τριαζολινονών)
Βοηθητικές ουσίες 72,4% β/β

Αποφυλλωτικό βάμβακος

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 8139/10-9-2007

ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ



®Σήμα κατατεθέν FMC

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διατηρήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.