

Triona® New EW

Paraffin oil (CAS 8042-47-5)

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

Εγγυημένη σύνθεση: Paraffin oil 54.6% β/ο ή 60.4% β/β

Βοηθητικές ουσίες 39.6% β/β

Εντομοκτόνο – Ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Άδειας Διάθεσης: 14707/16-7-2019

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

© Σήματα κατατεθέν BASF

Περιεχόμενο: **1** λίτρο

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: W. NEUDORFF GmbH KG, An der Muhle 3, D-31860 Emmerthal, Γερμανία.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι, τηλ.:210-6860130, www.basf-agro.gr



ΠΡΟΣΟΧΗ

BASF
We create chemistry

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμό φυλλώματος.

ΣΥΝΤΕΤΡΩΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΣ – ΔΟΣΕΙΣ (σε λίτρα σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού):

ΕΠΙΠΕΔΙΟΙΔΗ (Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά): Για Κοκκοειδή, Κόκκινη Ψώρα και άλλες ψώρες (*Aonidiella aurantii*), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής και πριν την αλλαγή χρωμάτων των καρπών. **Δόση:** 1-2 λίτρα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:** 50-150 λίτρα. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών μεγαλύτερο από 60 ημέρες. **ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ:** Για Τετράνυχους (*Panonychus ulmi*) στη Μήλια, κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής ως το δέσιμο των καρπών και μετά τη συγκομιδή. Για **Αφίδες** (*Aphis pomi*, *Dysaphis plantaginea*) στη Μήλια και στην Αχλάδα, κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την πρό-ισχυρη και μετά την συγκομιδή. Για **Ψύλλα** (*Cacopsylla pyri*) στη Μήλια και στην Αχλάδα, κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης ως τους μικρούς καρπούς. **Δόση:** 1 λίτρο. **Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:** 45-120 λίτρα. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 6-7 ημέρες. **ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ:** Για **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Myzus cerasi*, *Hyalopterus* sp.), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από τη ροζ κορυφή και μετά την συγκομιδή. **Δόση:** 1 λίτρο. **Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:** 45-120 λίτρα. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες. **ΕΛΙΑ:** Για Κοκκοειδή, Ακένιο και άλλες ψώρες (*Saissetia oleae*), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την πτώση των πετάλων ως τους μικρούς καρπούς. **Δόση:** 2 λίτρα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:** 30-75 λίτρα. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1. **ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ-ΑΓΓΟΥΡΙ-ΚΟΛΟΚΥΘΙ-ΠΙΠΙΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):** Για Αλευρώδεις (*Bemisia tabaci*, *Trioletodes varioratum*) και Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 1 λίτρο. **Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:** 30-120 λίτρα. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 60 ημέρες, όταν γίνεται χρήση σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς (8). **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ (ΥΠΟΪΦΡΟΥ):** Για Αλευρώδεις (*Aleyrodes proletella*), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 1 λίτρο. **Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:** 30-100 λίτρα. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών μεγαλύτερο από 60 ημέρες. **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ*** (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Κοκκοειδή, Ψώρα Σαν Ζοζέ (*Quadraspisulid perniciosus*), Βαμβάκαδα (ή Διστίση) (*Pseudalocaspis pentagona*, *Planococcus/Pseudococcus* sp.), Μυτιλόμορφ ψώρα (*Lepidosaphes ulmi*), Κόκκινη ψώρα (*Aonidiella aurantii*) και άλλες ψώρες (*Sphaerolecanium pruinosi*, *Eulecanium persicae*, *Melanaspis inopinata*), Κίτρινο Τετράνυχο (*Tetranychus urticae*), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την ροζ κορυφή και μετά τη συγκομιδή. **Δόση:** 1 λίτρο. **Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:** 45-120 λίτρα. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες. **ΑΜΠΕΛΙ*** (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Ψευδοκόκκο ή Βαμβάκαδα (*Planococcus citri*, *Planococcus ficus*) και άλλες ψώρες (*Parthenolecanium corni*, *Pulvinaria vitis*), **Ερίφωση** (*Eriophyes vitis*), **Μετκάλα** (*Metatella pruinosi*), **Θρίπες** (*Frankliniella occidentalis*), **Δροσφίλα** (*Drosophila suzukii*) κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την αρχή της βλάστησης ως το δέσιμο των καρπών και μετά τη συγκομιδή. **Δόση:** 1 λίτρο. **Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:** 45-120 λίτρα. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες. **ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ*** (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Κίτρινο Τετράνυχο (*Tetranychus urticae*), Ψώρα Σαν Ζοζέ (*Quadraspisulid perniciosus*), **Βαμβάκαδα ή Διστίση** (*Pseudalocaspis pentagona*), **Μετκάλα** (*Metatella pruinosi*), **Βαμβάκαδα** (*Eurhyllura* sp.), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την αρχή της βλάστησης ως το δέσιμο των καρπών και μετά τη συγκομιδή. **Δόση:** 1 λίτρο. **Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:** 45-120 λίτρα. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες. **ΡΟΔΙΑ*** (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Τετράνυχο (*Tetranychus urticae*), **Ακάρια** (*Eriophyes granati*), **Αλευρώδεις** (*Trioletodes varioratum*, *Bemisia tabaci*), **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum ephorbiae*, *Myzus persicae*), **Θρίπες** (*Thrips* sp.), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την αρχή της βλάστησης ως το δέσιμο των καρπών και μετά τη συγκομιδή. **Δόση:** 1 λίτρο. **Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:** 45-120 λίτρα. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες. **ΣΥΚΙΑ*** (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Κίτρινο Τετράνυχο (*Tetranychus urticae*), **Κηροπόδα** (*Ceroplastes rusci*), **Λογχαία ή μούρη μύγα των σύκων** (*Carpolonchaea aristella*), **Ψύλλα** (*Hemoloma ficus*), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την αρχή της βλάστησης ως το δέσιμο των καρπών και μετά τη συγκομιδή. **Δόση:** 1 λίτρο. **Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:** 45-120 λίτρα. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Ο όγκος ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από το ύψος του φυτού.
2. Στα εσπεριδοειδή χρησιμοποιήστε τη μικρή δόση στην πρώτη εφαρμογή και τη μεγάλη στη δεύτερη για την προστασία των καρπών.
3. Κατά τη χρήση του σκευάσματος, τα δέντρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μια εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
4. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι στρεσαρισμένα, σε περιόδους έντονης ζέσρας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν παρατηρείται ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυντε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογών κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφηστέ με αφεσάστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 10 μέτρων σε Εσπεριδοειδή και Ελιά, 10 μέτρων σε Μήλοειδη, Πηργόκαρπα, αμυγδαλιά, αμπέλι, ακτινίδια, ροδιά και σκιά για ώριμες εφαρμογές και 20 μέτρων σε Μήλοειδη, Πηργόκαρπα, αμυγδαλιά, αμπέλι, ακτινίδια, ροδιά και σκιά για πρώιμες εφαρμογές.

5. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξερνάται τους 32°C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
6. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα 40 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειοσφαιτίου.
7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευάσματος με δ.ο. carban, folpet ή dithionon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.
8. Στα θερμοκήπια να μην πραγματοποιείται δεύτερη εφαρμογή με μεσοδιάστημα μικρότερο των 60 ημερών, όταν γίνεται χρήση σεκασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς.
9. Στις υπαίθριες κηλίες κουνουπίδι και μπροκολο το μεσοδιάστημα αφορά την περίοδο διαδοχικών/κλιμακωτων φυτεύσεων στον ίδιο αγρό.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αμυγδαλιά, αμπέλι, ακτινίδια, ροδιά και σκιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απιστικές που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις χρήσης, δόσεις και προφυλάξεις.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, carban.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Μή-λια, Αχλάδα, Ροδάκινια, Δαμασκηνιά, Κεράσια, Βερίκοκιά, Ελιά, Αμυγδαλιά, Αμπέλι, Ακτινίδια, Ροδιά, Συκιά: καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.
Τομάτα-Μελιτζάνα-Πιπέρι-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι (θερμοκηπίου), Κουνουπίδι-Μπρόκολο (υπαίθρου): δεν ορίζεται.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Εμίξουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μείση. Προσθέτουμε τη συσταμμένη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο ανακατεύοντας. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό χυρίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του σκευάσματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ:

Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού δοχείου (2) φορές με καθαρό νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά δοχεία σκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ριχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με ρύτισμα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποθεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΟΧΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρείται στην αρχική του απορραφιστά σκευασσία, σε ήλιο, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερά για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

Αριθμός Παρτίδας: ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: ως άνω μέρος συσκευασίας

