

Focus[®]

Εστίασε στον
αποτελεσματικό έλεγχο
των αγρωστωδών
ζιζανίων!



Η ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ
ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.

- Καταπολέμα αποτελεσματικά ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια
- Ταχύτερη και μεγαλύτερη διάρκεια δράσης
- Μοναδικό αγρωστωδοκτόνο για την καταπολέμηση του κόκκινου ρυζιού
- Νέα διευρυμένη ετικέτα

 **BASF**

We create chemistry

Focus®

To Focus®, το εκλεκτικό και διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο της BASF, είναι απαραίτητο για τη μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία καθώς καταπολεμά αποτελεσματικά ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια.

Η δραστική ουσία του Focus®, cycloxydim, ανήκει στη χημική ομάδα των κυκλοεξανοδιονών, η οποία απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει το σχηματισμό των μεριστωματικών ιστών στα ευαίσθητα ζιζάνια.

Τα οφέλη του Focus®

Εκλεκτικότητα και διασυστηματικότητα

Αποτελεσματικότητα κατά των ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών

Μεγάλη διάρκεια δράσης

Ευρεία χρήση σε πολλές καλλιέργειες

Απαραίτητο προϊόν για τη ζιζανιοκτονία στην καλλιέργεια του ρυζιού

Ζιζανιοκτονία

Ο έλεγχος των ζιζανίων στις καλλιέργειες είναι απαραίτητος καθώς τα ζιζάνια ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες για χώρο, νερό, θρεπτικά στοιχεία και ήλιο. Χωρίς την έγκυρη και έγκαιρη αντιμετώπιση τους μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στην καλλιέργεια και μείωση της παραγωγής.

Γι' αυτό το λόγο, το Focus® είναι απαραίτητο για τη μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία της καλλιέργειας, καθώς εστιάζει στην αποτελεσματική καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών.

Συνιστώμενη δόση

Το Focus[®] προσφέρει στον παραγωγό αποτελεσματικό έλεγχο από τα κύρια ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια.
Η εγκεκριμένη δόση του Focus[®] έχει εύρος από 200 - 500 κ.εκ./στρέμμα και εξαρτάται από το είδος του ζιζανίου.

Στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα

Μουχρίτσα, αιματόχορτο, βέλιουρας,
σετάρια, βρόμος, πάνικο, φάλαρη,
λεπτόχλοα, φεστούκα, αλεπονουρά,
πολύανθη ήρα, άγρια είδη κριθαριού
και βρώμης καθώς και φυτά
εθελοντές σιταριού, κριθαριού
και βρώμης.

Στη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα

Κόκκινο ρύζι και αγριάδα.

Στη δόση των 500 κ.εκ./στρέμμα

Αγρόπιρο.

Τα ζιζάνια σταματούν να μεγαλώνουν λίγες ώρες μετά από την εφαρμογή
και έτσι παύει ο ανταγωνισμός με την καλλιέργεια, ενώ μέσα σε λίγες ημέρες
τα ζιζάνια εμφανίζουν ορατά κιτρινίσματα στα εσωτερικά σημεία και ακολουθεί
η πλήρης αποξήρανση και η νέκρωσή τους.






Η αποτελεσματικότητα του Focus® στα ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια

Τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι μία διαρκής απειλή για τις καλλιέργειες. Η οριστική απάντηση δίνεται από το Focus®, ένα στρατηγικό ζιζανιοκτόνο για την προστασία της καλλιέργειας με άριστη δράση στα αγρωστώδη ζιζάνια, ακόμα και σε αυτά που αντιμετωπίζονται δύσκολα. Προσφέροντας έτσι στον παραγωγό σιγουριά για το σωστό έλεγχο της καλλιέργειας του.

% αποτελεσματικότητα του Focus® σε ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια.



ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

<i>Echinochloa crus-galli</i>	Μουχρίτσα
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Αλοπονουρά
<i>Lolium multiflorum</i>	Πολύανθη Ήρα
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Αιματόχορτο
<i>Bromus spp.</i>	Βρόμος
<i>Setaria spp.</i>	Σετάρια
<i>Sorghum halepense</i>	Βέλιουρας
<i>Panicum dichotomiflorum</i>	Πάνικο
<i>Phalaris spp.</i>	Φάλαρη
<i>Cynodon dactylon</i>	Αγριάδα
<i>Oryza rufipogon</i>	Κόκκινο ρύζι
<i>Agropyron repens</i>	Αγρόπιρο


Μέσος όρος πειραμάτων που έγιναν από τη BASF και κατατέθηκαν με το φάκελο του προϊόντος.

Οι μετρήσεις της αποτελεσματικότητας, έγιναν 3-4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Αποτελεσματικό και γρήγορο σε ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια

Πειραματικά δεδομένα της BASF, αποδεικνύουν ότι το **Focus[®]** έχει ταχύτερη δράση και άριστη αποτελεσματικότητα σε σχέση με άλλα ζιζανιοκτόνα σε ένα μεγάλο εύρος αγρωστωδών.

% αποτελεσματικότητα



Μέσος όρος πειραμάτων που έγιναν από τη BASF και κατατέθηκαν με το φάκελο του προϊόντος.

█ Focus[®] █ M.O. κύριων ανταγωνιστικών

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Μουχρίτσα
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Αλοπονουρά
<i>Lolium multiflorum</i>	Πολύανθη Ήρα
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Αιματόχορτο
<i>Bromus spp.</i>	Βρόμος
<i>Setaria spp.</i>	Σετάρια
<i>Sorghum halepense</i>	Βέλιουρας
<i>Panicum dichotomiflorum</i>	Πάνικο
<i>Phalaris spp.</i>	Φάλαρη
<i>Cynodon dactylon</i>	Αγριάδα
<i>Oryza rufipogon</i>	Κόκκινο ρύζι
<i>Agropyron repens</i>	Αγρόπιρο

Οι μετρήσεις της αποτελεσματικότητας, έγιναν 1-2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

To Focus® εστιάζει στην καλλιέργεια του ρυζιού

Η καλλιέργεια του ρυζιού έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία για τη χώρα μας καθώς σε συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί την κύρια καλλιέργεια. Το Focus® εστιάζει, πέρα από πολλά αγρωστώδη ζιζάνια, στα δύο από τα τρία πιο ανθεκτικά ζιζάνια, το κόκκινο ρύζι και τη μουχρίτσα, που εμποδίζουν σημαντικά την ανάπτυξη της καλλιέργειας και υποβαθμίζουν την παραγωγή.

Μέθοδος της ψευδούς σποράς

Για τη χρήση του προϊόντος πρέπει τα «τηγάνια» να γεμίζονται με νερό μέχρι να φυτρώσει το κόκκινο ρύζι, η μουχρίτσα και τα άλλα ευαίσθητα ζιζάνια. Όταν τα ζιζάνια φυτρώσουν, αφαιρέστε το νερό ώστε τα φύλλα τους να είναι εκτεθειμένα στο ψεκαστικό διάλυμα, και κάνετε εφαρμογή του Focus®. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες προτού ξαναγεμίσετε τα «τηγάνια» με νερό.

Προσοχή: Μεταξύ της εφαρμογής του προϊόντος και της σποράς πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα τουλάχιστον 7-10 ημερών.

To Focus® εστιάζει σε περισσότερες εκτατικές καλλιέργειες

Με την επανέγκριση του Focus® προστέθηκαν περισσότερες εκτατικές καλλιέργειες στην επικέτα.

Τώρα εκτός από τις καλλιέργειες του βαμβακιού και των ζαχαρότευτλων, όπου το προϊόν έχει καθιερωθεί, το Focus® έχει εγκεκριμένη χρήση και στις καλλιέργειες του ηλίανθου, της ελαιοκράμβης, της σόγιας και των τεύτλων.

Καλλιέργειες που συχνά εμφανίζουν έντονα προβλήματα ανταγωνισμού από αγρωστώδη ζιζάνια, στα οποία το Focus® έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα!



To Focus[®] εστιάζει στις καλλιέργειες των λαχανικών & πατάτας

Η ετικέτα του Focus[®] διευρύνθηκε και με την προσθήκη κηπευτικών καλλιεργειών. Το μεγάλο εύρος της ετικέτας στις καλλιέργειες των λαχανικών αλλά και του αριθμού των ζιζανίων που ελέγχει, δίνει την απαραίτητη ευελιξία που χρειάζεται ο παραγωγός από ένα ζιζανιοκτόνο.

Οπότε με ένα μόνο προϊόν μπορεί να ελέγξει τα αγρωστώδη ζιζάνια σχεδόν σε όλες τις καλλιέργειες των λαχανικών καθιστώντας το Focus[®] απαραίτητο σύμμαχο για την προστασία της καλλιέργειας του από τον έντονο ανταγωνισμό των ζιζανίων.

Κράμβες

Λάχανο ή Κεφαλωτές
Κράμβες (λευκό λάχανο),
Λαχανάκια Βρυξελλών,
Φυλλώδεις Κράμβες
(κινέζικο λάχανο,
κόκκινο λάχανο).

Καρποφόρα Λαχανικά

Τομάτα, Πιπεριά,
Μελιτζάνα.

Όσπρια & ψυχανθή

Φασόλια (φρέσκα με λοβό),
Φασόλι (ξερό),
Μπιζέλι (ξερό), Φακές,
Λούπινα, Ρεβύθια.

Βολβώδη Λαχανικά

Κρεμμύδι, Σκόρδο,
Ασκαλώνιο,
Φρέσκο κρεμμυδάκι.

Φυλλώδη λαχανικά

Μαρούλι, Σκαρόλα,
Λυκοτρίβολο, Κάρδαμο,
Κόκκινο Σινάπι, Γαιοκάρδαμο,
Σπανάκι, Αντράκλα,
Αρωματικά φυτά.

Κονδυλώδη λαχανικά

Πατάτα.

Ριζωματώδη Λαχανικά

Καρότο, Ραπανάκι,
Παστινάκη, Λαγόχορτο,
Χρένο.



Λαχανικά με στέλεχος

Πράσο.



	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (PHI)
Δενδρώδεις Καλλιέργειες	Μπολιά	28
	Αχλαδιά	
	Κυδωνιά	
Αμπέλι	Αμπέλι οινοποιίσμιο	42
	Αμπέλι επιτραπέζιο	
	Σταφίδα	
Βολβώδη Λαχανικά	Κρεμμύδι	28
	Σκόρδο	
	Ασκαλώνιο	
	Φρέσκο κρεμμυδάκι	42
Καρποφόρα Λαχανικά	Τομάτα	42
	Πιπεριά	21
	Μελιτζάνα	42
Κράμβες	Λάχανο ή Κεφαλωτές Κράμβες (λευκό λάχανο)	28
	Λαχανάκια Βρυξελλών	42
	Φυλλώδεις Κράμβες (κινέζικο λάχανο, κόκκινο λάχανο)	
	Λάχανο με στέλεγχος	
Ριζωματώδη Λαχανικά	Πράσο	42
	Καρότα	35
	Ραπανάκι	
	Παστινάκη	
	Λαγόχορτο	Ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας
	Χρένο	

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (PHI)
Φυλλώδη Λαχανικά	Μαρούλι	21
	Σκαρόλα	
	Λυκοτρίβολο	
	Κάρδαμο	
	Κόκκινο Σινάπι	
	Γαιοκάρδαμο	
	Σπανάκι	
	Αντράκλα	
	Αρωματικά φυτά	
Όσπρια & Ψυχανθή	Φασόλια (φρέσκα με λοβό)	28
	Φασόλι (ξερό)	56
	Μπιζέλι (ξερό)	
	Φακές	
	Λούπινα	
	Ρεβύθια	
Τεύτλα	Ζαχαρότευτλα	Ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας
	Κτηνοροφικά τεύτλα	
	Γογγύλι	
	Παντζάρι	
Εκτατικές Καλλιέργειες	Βαμβάκι	Δεν ορίζεται
	Πατάτα	56
	Ελαικράμβη	Ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας
	Ρύζι	56
	Σόγια	Ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας
	Ηλίανθος	

® Σήμα κατατεθέν της BASF.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.
 Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
 Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι
 Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100, Fax: 210 68.60.200
<http://www.bASF-agro.gr>

We create chemistry